

О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011)

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12 сентября 2025 года № 74.

В соответствии со статьей 52 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и пунктом 29 приложения № 1 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Совет Евразийской экономической комиссии **решил**:

1.1 Внести в технический регламент Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011), принятый Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 799, изменения согласно приложению (далее – изменения).

2.1 Настоящее Решение вступает в силу по истечении 12 месяцев с даты его официального опубликования, за исключением подпункта "д" пункта 4 изменений (приложение к настоящему Решению), который вступает в силу с 1 января 2027 г.

Члены Совета Евразийской экономической комиссии:

От Республики Армения	От Республики Беларусь	От Республики Казахстан	От Кыргызской Республики	От Российской Федерации
М. Григорян	Н. Петкевич	С. Жумангарин	Д. Амангельдиев	А. Оверчук

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Совета
Евразийской экономической комиссии
от 12 сентября 2025 г. № 74

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в технический регламент Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011)

1. В приложении 1 к указанному техническому регламенту:

а) позицию 1669 изложить в следующей редакции:

"	1669	Перемещено или удалено	Moved or deleted		".
---	------	---------------------------	---------------------	--	----

б) дополнить позициями 1681 – 1694 следующего содержания:

"	1681	Тетрафторэти лен	Tetrafluoroeth ylene	116-14-3	204-126-9
	1682	6, 6' - ди-трет-бутил -2, 2' -	6, 6' - di-tert-butyl- 2, 2' -		204-327-1

		метиленди-п-крезол; [DBMC]	methylenedi-p-cresol; [DBMC]	119-47-1		
	1683	(5-хлор-2-метокси-4-метил-3-пиридил)(4,5,6-триметокси-о-толил) метанон; пириофенон	(5-chloro-2-methoxy-4-methyl-3-pyridyl)(4,5,6-trimethoxy-o-tolyl) methanone; pyriofenone	688046-61-9	692-456-8	
	1684	(RS)-1-{1-этил-4-[4-мезил-3-(2-меток-сизтокси)-о-толуоил] пиразол-5-илок-си} этилметилкарбонат; толпиралат	(RS)-1-{1-ethyl-4-[4-mesyl-3-(2-methoxyethoxy)-o-toluoyl] pyrazol-5-yloxy} ethyl methyl carbonate; tolpyralate	1101132-67-5	701-225-3	
	1685	Азаметифос (ISO); S-[(6-хлор-2-оксо-оксазоло[4,5-b]пи-ридин-3(2H)-ил)метил] O, O-диметил-тиофосфат	Azamethiphos (ISO); S-[(6-chloro-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl) methyl] O, O-dimethyl thiophosphate	35575-96-3	252-626-0	
	1686	3 - метилпиразол	3 - methylpyrazole	1453-58-3	215-925-7	
	1687	N-метокси-N-[1-метил-2-(2,4,6-трих-лорфенил)этил]-3-(дифторметил)-1-метилпиразол-4-карбоксаид; пидифлуметофен	N-methoxy-N-[1-methyl-2-(2,4,6-trichlorophenyl)-ethyl]-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxamide; pydiflumetofen	1228284-64-7	817-852-1	
		N-{2-[[1,1'-би(циклопропил)-2-ил] фенил]}-3-(дифторметил)	N-{2-[[1,1'-bi(cyclopropyl)]-2-yl] phenyl}-3-(difluoromethyl)			

	1688	дифторметил) -1-метил- 1H-пиразол-4- карбоксамид; седаксан	)-1-methyl- 1H-pyrazole-4- carboxamide; sedaxane	874967-67-6	688-331-2	
	1689	4 - метилпентан- 2-он; изобутилмети лкетон (MIBK)	4 - methylpentan- 2-one; isobutyl methyl ketone (MIBK)	108-10-1	203-550-1	
	1690	Диметоморф (ISO); (E,Z)-4-(3-(4- хлорфенил)-3- (3,4- диме-токсифе нил)акрилоил)морфолин	Dimethomorph (ISO); (E,Z)-4- (3-(4- chlorophenyl)- 3-(3,4- dimethoxy-phe nyl)acryloyl) morpholine	110488-70-5	404-200-2	
	1691	Имазамокс (ISO); (RS)-2-(4- изопропил-4- метил-5-оксо- 2-имидазолин -2-ил)-5- метоксиметил -никотиновая кислота	Imazamox (ISO); (RS)-2-(4- isopropyl-4- methyl-5-oxo- 2-imidazolin-2 -yl)-5- methoxymethy l-nicotinic acid	114311-32-9	601-305-7	
	1692	Тиаметоксам (ISO); 3-(2- хлортиазол-5- илметил)-5- метил [1,3,5] окса-диазинан -4- илиден-N-нит роамин	Thiamethoxam (ISO); 3-(2- chloro-thiazol- 5-ylmethyl)-5- methyl[1,3,5] oxa-diazinan-4 -ylidene-N-nitr oamine	153719-23-4	428-650-4	
	1693	Тритиконазол (ISO); (RS)-(E)-5-(4- хлорбензилид ен)-2,2- диметил-1-(1H-1,2,4- триазол-1- метил) циклопентано л	Triticonazole (ISO); (RS)-(E)-5-(4- chlorobenzylid ene)-2,2- dimethyl-1-(1H-1,2,4- triazol-1- methyl) cyclopentanol	138182-18-0	—	
		Десмедифам (ISO); этил 3-	Desmedipham (ISO); ethyl 3-			

	1694	фенилкар-бам оилоксифенил карбамат	phenyl-carbam oyloxyphenylc arbamate	13684-56-5	237-198-5	".
--	------	--	--	------------	-----------	----

2. В приложении 2 к указанному техническому регламенту:

а) позиции 8 – 9b, 22, 26 – 43, 47, 56, 98, 103 и 199 изложить в следующей редакции:

							(а) Должно быть напечат ано на этикетке : Соотно шение краски и окислит еля в смеси. При окрашив ании волос могут возника т ь серьезн ы е аллерги ческие реакции. Прочита й т е инструк ции и следуют е им. Данная продукц ия не предназ начена для использ ования лицами моложе 16 лет. Временн ы е татуиро вки " черной	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

"		N-замещенные производные р-фенилендиамин и их соли, N-замещенные производные о-фенилендиамин ⁽¹⁾ , за исключением производных, перечисленных в настоящ				(а) Общее применение	хной" могут увеличи ть риск аллерги и. Н е окрашив айте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувстви тельная кожа головы, - у вас есть раздраж ение и/ или поврежд ения кожи головы, - в ы когда-ли б о испытыв а л и какую-л и б о реакцию после окрашив ания волос, - ранее в ы испытал и реакцию н а временн ы е татуиро вки " " черной хной".		
---	--	---	--	--	--	---------------------------	---	--	--

	8	е м приложе нии и указанн ых в приложе нии 1 (№ 1309 , 1311, 1312) (N-substit uted derivativ es o f p-Phenyl ene-diam ine and their salts; N-substit uted deri-vati ves of o-Phenyl - enediami ne(1), with exceptio n o f those derivativ es listed elsewher e in this Annex and under reference № 1309, 1311, 1312 in Annex 1)	Красяще е веществ о в окисли-т ельных красках д л я волос	Содерж и т фенилен диамин ы. Н е использ уйте для окрашив ания бровей и ресниц.	
				(b) Должно быть напечат ано на этикетке : Соотно шение краски и окислит еля в смеси. При окрашив ании волос могут возника т ь серьезн ы е аллерги ческие реакции. Прочита й т е инструк ции и следуют е им. Данная продукц ия не предназ начена д л я использ ования	
				(b) Професс ио-наль н о е	

					примене ние Для (а) и (b): После смеси-в ания с окис-лит ельным реагенто м максима льная концент рация, применя емая для окрашив ания волос, н е должна пре-выш ать 3 процент а в пересчет е на свободн о е основан ие	лицами моложе 16 лет. Временн ы е татуиро вки " черной хной" могут увеличи ть риск аллерги и. Н е окрашив айте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувстви тельная кожа головы, - у вас есть раздраж ение и/ или поврежд ения кожи головы, - в ы когда-ли б о испытыв а л и какую-л и б о реакцию после окрашив ания волос, - ранее в ы испытал и реакцию
--	--	--	--	--	---	---

						на временные татуировки "черной хной". Содержит фенилендиамина. Использовать перчатки.	
						(а) Должно быть напечатано на этикетке : Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназ	

[illegible]

			р-Фенил ендиами н (p-Phenyl enedi-am ine) р-Фенил ендиами н HCl (p-Phenyl enedi-am ine HCl) р-Фенил ендиами н сульфат (p-Phenyl enedi-am i n e Sulphate) CAS № 106-50-3 / 624-18- 0/16245- 77-5 ЕС № 203-404- 7/ 210- 834-9/ 240-357- 1	Красяще е веществ о в окисли-т ельных красках д л я волос		- ранее в ы испытал и реакцию н а временн ы е татуиро вки " " черной хной". Содерж и т фенилен диамин ы. Н е использ уйте для окрашив ания бровей и ресниц.	
	8a	р-Фенил ендиами н и его соли (p-Phenyl enediami ne and its salts)				(b) Должно быть напечат ано на этикетке : Соотно шение краски и окислит еля в смеси. Только д л я професс иональн о г о примене ния. При окрашив ании волос могут возника т ь	

						серьезны е аллергические реакции. Прочитайте инструкцию и следуйте им.
	(b) Профессорно-научное применение					Данная продукция не предназначена для использования
	Для (a) и (b):					лицами
	После смешивания с окислительным реагентом, максимальной концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 2 процента в пересчете на свободное основание					моложе 16 лет. Временные татуировки "черной" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения

						кожи головы, - в ы когда-ли б о испытыв а л и какую-л и б о реакцию после окрашив ания волос, - ранее в ы испытал и реакцию н а временн ы е татуиро вки " черной хной". Содерж и т фенилен диамин ы. Использ овать перчатк и.	
						Должно быть напечат ано на этикетке : Соотно шение краски и окислит еля в смеси. Только для професс иональн	

8b	p-Фенил ендиами н и его соли (p-Phenyl enedi-am ine and its salts)	p-Фенил ендиами н (p-Phenyl ene-diam ine) p-Фенил ендиами н HCl (p-Phenyl ene-diam ine HCl) p-фенил ендиами н сульфат (p-Phenyl ene-diam i n e Sulphate)	Продукц и я предназ на-чена для окрашив ания ресниц	После смешива ния с окислит ель-ным реаген-т ом , макси-м альная кон-цен трация, применя емая для окраши- вания ресниц, н е должна превыш ать 2 процент а в пересчет	о г о примене ния. При окрашив ании ресниц могут возника т ь серьезн ы е аллерги ческие реакции. Прочита й т е инструк ции и следуйт е им. Данная продукц ия не пред-наз начена для использ ования лицами с моложе 16 лет. Временн ы е татуиро вки " " черной хной" " могут увеличи ть риск аллерги и. Н е окрашив айте ваши ресницы , если: - высыпан ия на лице и

			CAS № 106-50-3 / 624-18-0 / 16245- 77-5 ЕС № 203-404- 7/ 210-834- 9/240- 357-1			е на чувс-тви свободн тельной, о е раздраж основан енной ие. и Только поврежд для енной професс кожи ио-наль головы; ного - в ы использ когда-ли ова-ния б о испытыв али какую-л и б о реакцию после окрашив ания волос или ресниц; - ранее в ы испытал и реакцию на временн ы е татуиро вки " черной хной". Избегат ь попадан ия в глаза, в случае попадан ия в глаза немедле нно промыть . Содерж и т фенилен диамин ы.
--	--	--	--	--	--	---

							Используй- вать перчат- ки.	
				(а) Крася-ще е е вещес-т во в окис-лит ельных красках для волос		(а) После сме-шив ания с окислит ель-ным реаген-т ом , максима -льная концен- трация, при-мен яемая для окрашив ания волос, н е дол-жна превы-ш ать 1 про-цен т.	(а) Должно быть напечат ано на этикетке : Соотно шение краски и окислит еля в смеси. При окрашив ании волос могут возника ть серьезн ые аллерги ческие реакции. Прочита йте инструк ции и следуют е им. Данная продукц ия не пред-наз начена для использ ования лицами моложе 16 лет. Временн ые татуиро вки " черной хной"	
		Этанол, 2,2'-[(2- нитро- 1,4- фени-ле н) диимино	N,N'-би (2 - гидрок-с изтил)-2 - нитро-р- фенилен диамин (N,N'- Bis(2- Hyd-rox					

8с	]	бис-(9Cl) (Ethanol, 2,2'-[(2-nitro-1,4-phenylene)diimino]bis-(9Cl))	y-ethyl)-2 - Nitro-phenylene-diamine) CAS № 84041-77-0 EC № 281-856-4	(b) Красящие вещества в нео-кислительных красках для волос	(b) 1,5 процент а	Для (а) и (б): - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг / кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитритов.	могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждение кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытывали реакцию на временные татуировки "черной хной".

(а)
Должно
быть
напечат
ано на
этикетке
:
Соотно
шение
краски
и
окислит
еля в
смеси.
При
окрашив
ании
волос
могут
возника
т ь
серьезн
ы е
аллерги
ческие
реакции.
Прочита
йт е
инструк
цию и
следуйт
е ей.
Данная
продукц
ия не
предназ
начена
для
использ
ования
лицами
моложе
16 лет.
Временн
ы е
татуиро
вки "
черной
хной"
могут
увеличи
ть риск
аллерги
и.

(а)
Общее

[illegible]

		413, 1144, 1310, 1313 и 1507	Красяще е веществ о		ания бровей и ресниц.	
	9	в Прилож ении 1 (Methylp henylene - diamines , their N-substit uted deri-vati ves and their salts ⁽¹⁾ with the exceptio n of the substanc e listed under reference numbers 9 a and 9 b of this Annex and the substanc es listed under refe-renc e numbers 364, 413, 1144, 1310, 1313 and 1507 of Annex 1)	в окисли-т ельных красках для волос		(b) Должно быть напечат ано на этикетке : Соотно шение краски и окислит еля в смеси. Только для професс иональн ого примене ния. При окрашив ании волос могут возника ть серьезн ые аллерги ческие реакции. Прочита йте инструк цию и следуйт е ей. Данная продукц ия не предназ начена для использ ования лицами моложе 16 лет.	
				(b) Професс ио-наль ное примене ние Для (a) и (b):		

						После смеси-в ания с окис-лит ельным реагенто м , максима льная концент рация, применя емая для окраши- вания волос, н е должна превыш ать 5 процент ов в пересчет е на свободн о е основан ие	Временн ы е татуиро вки " черной хной" могут увеличи ть риск аллерги и. Н е окрашив айте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувстви тельная кожа головы, - у вас есть раздраж ение и/ или поврежд ения кожи головы, - вы когда-ли б о испытыв али какую-л и б о реакцию после окрашив ания волос, - ранее вы испытал и реакцию на временн ы е
--	--	--	--	--	--	--	--

						татуиро вки " черной хной". Содерж и т фенилен диамин ы (толуиле ндиамин ы) . Использ овать перчатк и.	
						(а) Должно быть напечат ано на этикетке : Соотно шение краски и окислит еля в смеси. При окрашив ании волос могут возника т ь серьезн ы е аллерги ческие реакции. Прочита й т е инструк ции и следуют е им. Данная продукц ия не предназ-	

[illegible]

						на временные татуировки "черной хной". Содержит фенилендиамина (толуиленидиамин). (a) (i) Не использовать в продукции для окрашивания ресниц (a) (ii) Использовать перчатки и Только для профессионального применения.
	9a	1,4-Бензолдиамин, 2-метил-2,5-Диаминотолуол сульфат (1,4-Benzene di-amine, 2-methyl-2,5-Diamino-toluene sulphate)	Толуол-2,5-диамин (Toluene -2,5-Di-amine) Толуол-2,5-диамин сульфат (Toluene -2,5-Diamine Sulfate) CAS № 95-70-5 / 615-50-9 , EC № 202-442-1 / 210-431-8	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос (b) Продукция для окрашивания ресниц		(b) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании ресниц

могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе

16 лет.
Временны
е
татуиро
вки "ч
ерной
хной"
могут
увеличи
ть риск
аллерги
и.
Не
окрашив
айте
ваши
ресницы
, если:
- у вас
сыпь на
лице
или
чувстви
тельная,
раздраж
енная
или
поврежд
енная

(б)
Профес-
сionalь-
н о е
примене-
ния
Для (а)
и (б):
После
сме-шив-
ания с
окислит-
ель-ным
реаген-т
о м ,
макси-м
альная
кон-цен-
трация,
применя-
емая для
окраши-
вания
волос
и ли
ресниц,
н е
должна
превыш

					ать 2,0 процент а (в пересчет е на свободн о е основан ие) или 3 , 6 процент а (в пересчет е на сульфат)	кожа головы, - вы когда-ли бо испытыв али какую-л и бо реакцию после окрашив ания волос или ресниц, - ранее вы испытал и реакцию на временн ые татуиро вки " черной хной". Избегат ь попадан ия в глаза, в случае попадан ия в глаза немедле нно промыть . Содерж и т фенилен диамин ы (толуиле ндиамин ы) . Использ овать перчатк и.
--	--	--	--	--	--	---

						Только для профессионального применения	
						Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникнуть серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкцию и следуйте ей. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черной	
		1-Метил-2,6-бис-(2-оксизтилами-но)-бензол	2,6-Дигидроксизтиламинотолуол (2,6-Dihydro	Красящее вещество		После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 1,0 процент. Не используйте с	

9b	(1 - Methyl-2,6-bis- (2 - hydroxyethyl-amino)-benzene)	xyet-hyl-aminotoluene) CAS № 149330-25-6 EC № 443-210-1)	в окислительных красках для волос		нитро-зирующим и ингредиентами. - Максимальное содержание нитро-заминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	хной" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте волосы, если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительная, раздраженная и поврежденная кожа головы; - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос; - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки " черной хной".		
						(а) Должно быть напечатано на этикетке :		

							Соотношение краски и окислителя в смеси При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "Черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы, если:
						Для (а) и (б): После смешивания с окислительным реагентом, максима	

					(а) Крася-ще е е вещес-т во в окис-лит ельных красках для волос		льная концент рация, применя емая для окраши- вания волос или ресниц, н е должна превыш ать 1,25 процент а	- у вас сыпь на лице; - у вас чувстви тельная кожа головы, - у вас есть раздраж ение и/ или поврежд ения кожи головы, - в ы когда-ли б о испытыв а ли какую-л и б о реакцию после окрашив ания волос, - ранее в ы испытал и реакцию н а временн ы е татуиро вки " черной хной". Содерж и т резорци н. Промыт ь волосы хорошо после нанесен ия. При попадан	
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

	22	1,3-Бензолдиол (1,3-Benzene diol)	Резорцин (Resorcinol) CAS № 108-46-3, EC № 203-585-2			ии в глаза немедленно промыть. Не использовать для окрашивания ресниц.	
						(b) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окис-лителя в смеси Только для профессионального применения. Содержит резорцин. При окрашивании ресниц могут возникнуть серьезные аллергические реакции. Прочитай инструкцию и	

						следуют е им. Данная продукц ия не предназ- начена для использ ования лицами моложе 16 лет.
			(b) Продук- ция предназ- наченна я для окрашив ания ресниц	(b) Только для профес- сиональ ного примене ния	Временн ые татуиро вки "	черная хна" могут увеличи ть риск аллерги и. Не окрашив айте ваши ресницы , если: - у вас высыпан ия на лице; - у вас чувстви тельная кожа головы, - вы когда-ли бо испытыв али какую-л ибо реакцию после окрашив ания волос или ресниц,

						- ранее в ы испытал и реакцию н а временн ы е татуиро вки " черной хной". При попадан ии в глаза немедле нно промыть .	
				(с) Лосьоны для волос и шампун и	(с) 0,5 процент а	(с) Содерж и т резорци н	
						(а) Содерж и т монофто рфосфат аммония Для любой зубной пасты с соедине ниями, содержа щими фторид в концент рации от 0,1 до 0,15 (включит ельно) процент а в пересчет е на	

						молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрослых") обязательно на следующей маркировка или аналогичная по смыслу: Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошин. Для минимизации глотания осуществляют чистку под контролем взрослых.
				(a) 0,15 процент а в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать	(a) не использовать средств а х гигиены полости рта жидких для детей в возрасте до 6 лет	

	26	Монофторфосфат аммония (Ammonium monofluorophosphate) CAS № 20859-38-5/66115-19-3	Монофторфосфат аммония (Ammonium monofluorophosphate) CAS № 20859-38-5/66115-19-3	Средства гигиены полости рта	ать 0,15 процента.	Для средств гигиены полости рта жидких, если они не замаркированы как противо-показанные для детей (например, "только для взрослых") обязательна маркировка о возрастном ограничении, установленном изготовителем. В случае потребления фтора из других источников обратитесь за консультацией по применению продукции к стоматологу или врачу.

					(b) В кон-цен-трации более 0,15 – 0,5 (включи-тельно) процент а в пересчет е на молярну ю массу фтора. В смеси с другими фторсод ер-жащи м и соедине ни-ями, разре-ш енными в данном приложе -нии, общая концент -рация фтора не должна превыш ать 0,5 процент а.	(b) Содерж и т монофто рфосфат аммония . Н е предназ начена для дли-тель ного приме-нения. При использ овании данного продукт а не рекомен дуется потребл ение фтора из других источни ков Н е применя ть для ли ц моложе 16 лет. Примен яется по рекомен дации стоматолога и под его наблюде нием.	
						(a) Ссодерж и т монофто рфосфат натрия. Для любой зубной	

						пасты с соединением, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 (включительно) в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрослых") обязательно на следующей маркировка или аналогичная по смыслу. Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер
				(a) 0,15		
				процент а в пере-счете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими и	(a) не использовать средства	

					соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.	гигиены полости рта жидких для детей в возрасте до 6 лет	горошин ы. Для минимизации глотания осуществлять чистку под контролем взрослых. Для средств гигиены полости рта жидких, если они не замаркированы как противопоказанные для детей (например, "только для взрослых") обязательно на маркировке о возрастных ограничениях, установленном изготовителем. В случае потребления фтора из других источни
27	Динатрий фторфосфат (Disodium fluorophosphate)	Монофторфосфат натрия (Sodium monofluoro-phosphate) CAS № 10163-15-2/ 7631-97-2, EC № 233-433-0/ 231-552-2	Средства гигиены полости рта				

						к о в обратит есь за консуль тацией п о примене нию продукц ии к стомато логу или врачу.	
				(b) В кон-цен трации более 0,15 – 0,5 (в ключи- тельно) процент а в пере-сче те на молярну ю массу фтора. В смеси с другими фторсод ержащи ми соедине ниями, разре-ш енными в данном приложе нии, общая концент рация фтора не должна превы-ш ать 0,5		(b) Содерж и т монофто рфосфат натрия Н е предназ начена для дли-тель ного примене ния. При использ овании данного продукт а не рекомен дуется потребл ение фтора из других источни ков Н е применя ть для лиц моложе 16 лет. Примен яется по рекомен дации стомато лога и под его	

					процент а.	наблюде нием.	
					(а) 0,15	(а) Содерж и т монофто рфосфат калия. Дл я любой зубной пасты с соедине ниями, содержа щими фторид в концент рации от 0,1 до 0,15 (включит ельно) процент а в пересчет е н а молярну ю массу фтора, если она н е замарки рована к а к противо показан ная для детей (наприме р , " только д л я взрослы х ") обязател ь н а следую щ а я маркиро вка или аналоги	

				процент а в пересчет е на молярну ю массу фтора. В смеси с другими фторсод ержащи м и соедине ни-ями, разре-ш енными в данном приложе -нии, общая концент -рация фтора не должна превыш ать 0,15 процент а.	(а) не исполь-з овать в сред-ств а х гигиены полости рта жидких для детей в воз-раст е до 6 лет	чная по смыслу. Дети 6 лет и младше: количес т в о использ уемой пасты не должно превыш а т ь размер горошин ы. Для миними зации глотани я осущест влять чистку п о д контрол е м взрослы х. Для средств гигиены полости рта жидких, если они н е замарки рованы к а к противо по-казан ные для детей (наприме р , " только для взрослы х ") обяз-зате льна маркиро вка о воз-раст
28	Дикалий фторфос фат (Dipotassi u m fluoroph osphate)	Монофт орфосфа т калия (Potassiu m monoflu oro-phos phate) CAS № 14104- 28-0, ЕС № 237-957- 0	Средств а гигиены полости рта			

						н о м огранич ении, уста-нов ленным изготов ителем. В случае потребл ения фтора из других источни к о в обратит есь за консуль тацией п о примене нию продукц ии к стомато логу или врачу.	
				(b) В кон-цен трации более 0,15 – 0,5 (включи- тельно) процент а в пересчет е на моляр-н ую массу фтора. В смеси с другими фторсод ержащи м и соедине		(b) Содерж и т монофто рфосфат калия Н е предназ начена для дли-тель ного примене ния. При использ овании данного продукт а не рекомен дуется потребл ение фтора из других источни ков	

					ни-ями, разре-ш енными в данном приложе -нии, общая концент ра-ция фтора не должна превыш ать 0,5 про-цен та	Н е применя ть для лиц моложе 16 лет. Примен яется по рекомен дации стомато лога и под его наблюде нием.	
						(а) Содерж и т монофто рфосфат кальция Д л я любой зубной пасты с соедине ниями, содержа щими фторид в концент рации от 0,1 до 0,15 (включит ельно) процент а в пересчет е н а молярну ю массу фтора, если она н е замарки рована к а к противо по-казан ная для детей (	

29	Кальций фторфос- фат (Calcium fluoroph- osphate)	Монофт- орфосфа- т кальция (Calcium monoflu- oro-phos- phate) CAS № 7789-74- 4,	Средст- ва гигиены полости рта	(а) 0,15 процент а в пересчет е на молярну- ю массу фтора. В смеси с другими фторсод- ержащи- ми соедине- ниями, раз-реш- енными в данном приложе- нии, общая концент- рация фтора не должна превыш- ать 0,15 процент а	(а) не использ- овать в средства х гигиены полости рта жидких для детей в возрасте до 6 лет	наприме- р, " " только для взрослы- х ") обяза-те- льна следую- щая маркиро- вка или аналоги- чная по смыслу: Дети 6 лет и младше: количес- тво использ- уемой пасты не должно превыш- ать размер горошин ы. Для миними- зации глотани- я осущест- влять чистку под контрол- ем взрослы- х. Для средств гигиены полости рта жидких, если они не замарки- рованы как противо- по-казан
----	---	---	--	--	---	--

		ЕС № 232-187- 1		ные для детей (наприме р, " только для взрослы х ") обяза-те льна маркиро вка о возрастн о м огранич ении, установ ленным изготов ителем. В случае потребл ения фтора из других источни к о в обратит есь за консуль тацией п о примене нию продукц ии к стомато логу или врачу.	
			(b) В кон-цен трации более 0,15 – 0,5 (включи- тельно) процент а в пересчет е на	(b) Содерж и т монофто рфосфат кальция Н е предназ начена для дли-тель ного примене ния.	

					молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими и соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.	При использовании данного продукта не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.	
						(а) Содержит фтористый кальций Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 (включительно) процент	

						а в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрослых") обязательно на следующая маркировка или аналогичная по смыслу: Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошин. Для минимизации глотания осуществлять чистку под контролем
				(а) 0,15 процент а в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими и соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превыш	(а) не использовать в средствах гигиены полости рта жидких для детей в возрасте до 6 лет	е м

	30	Фтористый кальций (Calcium fluoride)	Фтористый кальций (Calcium fluoride) CAS № 7789-75-5, ЕС № 232-188-7	Средства гигиены полости рта	ать 0,15 процента.	взрослых. Для средств гигиены полости рта жидких, если они не замаркированы как противопоказанные для детей (например, "только для взрослых") обязательно маркировка о возрастном ограничении, установленным изготовителем. В случае потребления фтора из других источников обратитесь за консультацией по применению к стоматологу или врачу.
--	----	--------------------------------------	--	------------------------------	--------------------	---

					(b) В кон-цен-трации более 0,15 – 0,5 (включи-тельно) процент а в пересчет е на молярну ю массу фтора. В смеси с другими фторсод-ержащи м и соедине-ни-ями, разре-ш-енными в данном приложе-нии, общая концент-рация фтора в пересчет е на молярну ю массу фтора не должна превыш-ать 0,5 процент а	(b) Содерж и т фторист ы й кальций Н е предназ-начена для длитель-ного приме-нения. При исполь-зовании данного продукт а не рекомен-дуется потребл-ение фтора из других источни-ков Н е применя-ть для лиц моложе 16 лет. Примен-яется по рекомен-дации стомато-лога и под его наблюде-нием.
						(a) Содерж и т фторист ы й натрий Для любой зубной пасты

						с соедине ниями, содержа щими фторид в концент рации от 0,1 до 0,15 (включит ельно) процент о в в пересчет е на молярну ю массу фтора, если она н е замарки рована к а к противо показан ная для детей (на приме р , " только д л я взрослы х ") обяза-те льна следую щ а я маркиро вка или аналоги чная по смыслу: Дети 6 лет и младше: количес т в о использ уемой пасты не должно превыш
				(а) 0,15 процент а в пересчет е на молярну ю массу фтора. В смеси с другими фторсод ержащи	(а) не использ овать в средства х	

					м и соедине ни-ями, разре-ш енными в данном приложе -нии, общая концент рация фтора не должна превыш ать 0,15 процент а.	гигиены полости р т а жидких д л я детей в возрасте до 6 лет	а т ь размер горошин ы. Для миними зации глотани я осущест влять чистку п о д контрол е м взрослы х. Д л я средств гигиены полости р т а жидких, если они н е замарки рованы к а к противо по-казан ные для детей (наприме р , " только д л я взрослы х ") обяза-те льна маркиро вка о возрастн о м огранич ении, установ ленным изготов ителем. В случае потребл ения фтора из других
31	Фторист ы й натрий (Sodium fluoride)	Фторист ы й натрий (Sodium fluoride) CAS № 7681-49- 4, ЕС № 231-667- 8	Средств а гигиены полости рта				

					источни к о в обратит есь за консуль тацией п о примене нию продукц ии к стомато логу или врачу.	
				(b) В кон-цен трации более 0,15 – 0,5 (в ключи- тельно) процент а в пересчет е на молярну ю массу фтора. В смеси с другими фторсод ержащи м и соедине ни-ями, разре-ш енными в данном приложе -нии, общая концент -рация фтора в пересчет е на моляр-н ую массу фтора не	(b) Содерж и т фторист ы й натрий Н е предназ начена для дли-тель ного примене ния. При использ овании данного продукт а не рекомен дуется потребл ение фтора из других источни ков Н е применя ть для лиц моложе 16 лет. Примен яется по рекомен дации стомато	

					должна превыш ать 0,5 процент а	лога и под его наблюде нием.	
						(а) Содерж и т фторист ы й калий Д л я любой зубной пасты с соедине ниями, содержа щими фторид в концент рации от 0,1 до 0,15 (включит ельно) процент о в в пересчет е н а молярну ю массу фтора, если она н е замарки рована к а к противо по-казан ная для детей (наприме р , " только д л я взрослы х ") обяза-те льна следую щ а я	

	32	Фтористый калий (Potassium fluoride)	Фтористый калий (Potassium fluoride) CAS № 7789-23-3, ЕС № 232-151-5	Средства гигиены полости рта	(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими и соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.	(а) не использовать средства гигиены полости рта жидких для детей в возрасте до 6 лет	маркировка или аналогичная по смыслу: Дети 6 лет и младше: количество использованной пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизации глотания осуществлять чистку под контролем взрослых. Для средств гигиены полости рта жидких, если они не замаркированы как противопоказанные для детей (например, "только для взрослых") обязательна
--	----	---	---	------------------------------	--	---	--

						маркиро вка о возрастн о м огранич ении, установ ленным изготов ителем. В случае потребл ения фтора из других источни к о в обратит есь за консуль тацией п о примене нию продукц ии к стомато логу или врачу.	
				(b) В кон-цен трации более 0,15 – 0,5 (в кклю-чи тельно) процент а в пересчет е на молярну ю массу фтора. В смеси с другими фторсод ержащи м и соедине		(b) Содерж и т фторист ы й калий. Н е предназ начена для дли-тель ного примене ния. При использ овании данного продукт а не рекомен дуется потребл ение фтора из	

					ни-ями, разре-шенными в данном приложе-нии, общая концент-рация фтора не должна превыш ать 0,5 процент а.	других источни ков Н е применя ть для лиц моложе 16 лет. Примен яется по рекомен дации стоматолога и под его наблюде нием.	
						(а) Содерж и т фторист ы й аммони й. Дл я любой зубной пасты с соедине ниями, содержа щими фторид в концент рации от 0,1 до 0,15 (включит ельно) процент а в пересчет е н а молярну ю массу фтора, если она н е замарки рована к а к противо	

33	Фтористый аммоний	Фтористый аммоний (Ammonium fluoride)	Средства	(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента. (а) не использовать средства гигиены полости рта жидких для детей в возрасте до 6 лет	по-казанная для детей (например, "только для взрослых") обязательна следующая маркировка или аналогичная по смыслу: Дети 6 лет и младше: количество использованной пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизации глотания осуществлять чистку под контролем взрослых. Для средств гигиены полости рта жидких, если они не замаркированы
----	-------------------	---------------------------------------	----------	--	---

		(Ammonium fluoride)	CAS № 12125- 01-8, EC № 235-185- 9	гигиены полости рта		к а к противо показан ные для детей (наприме р , " только для взрослы х ") обязател ь н а маркиро вка о возрастн о м огранич ении, установ ленным изготов ителем. В случае потребл ения фтора из других источни к о в обратит есь за консуль тацией п о примене нию продукц ии к стомато логу или врачу.	
					(b) В концент рации более 0,15 – 0,5 (включит ельно) процент	(b) Содерж и т фторист ы й аммони й. Н е предназ начена для дли-тель	

					а в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.	ного применения. При использовании данного продукта не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.	
						(а) Содержит фтористый алюминий Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до	

						0,15 (включительно) процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрослых") обязательно на следующая маркировка или аналогичная по смыслу: Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошин. Для минимизации глотания осуществлять
				(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими и соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация	(а) не использовать в средствах гигиены полости рта жидких для детей в возрасте до 6 лет	

					трация фтора не должна пре-выш ать 0,15 процент а.		чистку п о д контрол е м взрослы х. Д л я средств гигиены полости р т а жидких, если они н е замар-ки рованы к а к противо пока-зан ные для детей (наприме р , " только д л я взрослы х ") обя-зате льна маркиро вка о возрас-т н о м огранич ении, установ- ленным изготов ителем. В случае потребл ения фтора из других источни к о в обратит есь за консуль тацией п о примене нию продукц
34	Фторист ы й алюмин ий (Alumini u m fluoride)	Фторист ы й алюмин ий (Alumini u m fluoride) CAS № 7784-18- 1, ЕС № 232-051- 1	Средств а гигиены полости рта				

						и и к стомато логу или врачу.	
					(b) В кон-цен трации более 0,15 – 0,5 (включи- тельно) про-цен та в пе-ресче те на молярну ю массу фтора. В смеси с другими фторсод ержащи м и соедине ни-ями, разре-ш енными в данном приложе нии, общая кон-цен трация фтора не должна пре-выш ать 0,5 процент а.	(b) Содерж и т фторист ы й аллюми ний. Н е предназ начена д л я дли-тель ного примене ния. П р и использ овании данного продукт а н е рекомен дуется потребл ение фтора из других источни ков Н е применя ть для ли ц моложе 16 лет. Примен яется по рекомен дации стомато лога и под его наблюде нием.	
						(а) Содерж и т фторист ое олово	

				(а) 0,15 процент а в пересчет е на моляр-н ую массу фтора. В смеси	Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 (включительно) процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей ("например, только для взрослых") обязательно следующая маркировка или аналогичная по смыслу: Дети 6 лет и младше: количество используемой
--	--	--	--	--	--

					с другими фторсодержащими и соединени-ями, разре-шенными в данном приложе-нии, общая кон-цен-трация фтора не должна пре-выш-ать 0,15 процент а.	(а) не исполь-зовать в средствах гигиены полости рта жидких для детей в возрасте до 6 лет	пасты не должно пре-выш-а-ть размер горошин ы. Для миними-зации глотани-я осу-ществ-лять чистку под контро-ле м взрос-лы х. Для средств гигиены полости рта жидких, если они не зама-р-ки-рованы как про-тиво-по-казан-ные для детей (напри-мер, "только для взрос-лы х ") обяза-те-льна мар-киро-вка о возраст-ном огра-ни-чении, ус-та-нов-ленным из-готов-ителем. В случае потре-бл
35	Дифтористое олово (Tin difluoride)	Фтористое олово (Stannous fluoride) CAS № 7783-47-3, EC № 231-999-3	Средства гигиены полости рта				

					ения фтора из других источни к о в обратит есь за консуль тацией п о примене нию продукц ии к стомато логу или врачу.	
				(b) В кон-цен трации более 0,15 – 0,5 (включи тельно) процент а в пересчет е на моляр-н ую массу фтора. В смеси с другими фторсод ержащи м и соедине ни-ями, разре-ш енными в данном приложе -нии, общая концент ра-ция фтора не должна	(b) Содерж и т фторист ое олово Н е предназ начена для дли-тель ного примене ния. При использ овании данного продукт а не рекомен дуется потребл ение фтора из других источни ков Н е применя ть для лиц моложе 16 лет. Примен яется по рекомен дации	

					превыш ать 0,5 процент а.	стомато лога и под его наблюде нием.	
						(а) Содерж и т гексадец иламмон и й фторид. Дл я любой зубной пасты с соедине ниями, содержа щими фторид в концент рации от 0,1 до 0,15 (включит ельно) процент а в пересчет е н а молярну ю массу фтора, если она н е замарки рована к а к противо по-казан ная для детей (наприме р , " только д л я взрослы х ") обяза-те льна следую щ а я	

Гексадециламмоний фторид (Hexadecyl ammonium fluoride)

Цетиламин гидрофторид (Cetylamine Hydrofluoride) CAS No3151-59-5, EC № 221-588-7

Средства гигиены полости рта

(а) 0,15 процент а в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.

(а) не использовать в средствах гигиены полости рта жидких для детей в возрасте до 6 лет

маркировка или аналогичная по смыслу: Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизации глотания осуществлять чистку под контролем взрослых. Для средств гигиены полости рта жидких, если они не замаркированы как противопоказанные для детей (например, "только для взрослых") обязательна

						маркиро вка о возрастн о м огранич ении, установ ленным изготов ителем. В случае потребл ения фтора из других источни к о в обратит есь за консуль тацией п о примене нию продукц ии к стомато логу или врачу.	
				(b) В кон-цен трации более 0,15 – 0,5 (включи тельно) процент а в пересчет е на моляр-н ую массу фтора. В смеси с другими фторсод ержащи		(b) Содерж и т гексадец иламмон и й фторид. Н е предназ начена для дли-тель ного примене ния. При использ овании данного продукт а не рекомен дуется потребл ение	

					м и соедине ни-ями, разре-ш енными в данном приложе -нии, общая концент ра-ция фтора не должна превыш ать 0,5 про-цен та.	фтора из других источни ков Н е применя ть для лиц моложе 16 лет. Примен яется по рекомен дации стомато лога и под его наблюде нием.	
						(а) Содерж ит 3-(N-гекса децил-N - 2) гидрокс изтилам моний) пропилб ис(2- гидрокс изтил) аммония дифтори д. Дл я любой зубной пасты с соедине ниями, содержа щими фторид в концент рации от 0,1 до 0,15 (включит ельно) процент а в	

(а) 0,15 процент а в пересчет е на моляр-н у ю массу фтора. В смеси с другими фторсод ер-жащи м и соедине ни-ями, разре-ш енными в данном приложе нии, общая концент ра-ция фтора не должна превыш

(а) не исполь-з овать в сред-ств а х гигиены полости рта жидких для детей в воз-раст е до 6 лет

пересчет е на молярну ю массу фтора, если она н е замарки рована к а к противо по-казан ная для детей (на приме р , " только для взрослы х ") обя-зате льна следую щ а я маркиро вка или аналоги чная по смыслу: Дети 6 лет и младше: количес т в о использ уемой пасты не должно превыш а т ь размер горошин ы. Для миними зации глотани я осущест влять чистку под контрол

	37	- 2 - гид-роксизтиламоний) про-пилбис-(2-гидроксиэтил) аммония дифторид (3 - (N-Hexadecyl-N-2 - hydroxyethylammonio) propylbis (2 - hydroxyethyl) ammonium difluoride	Средства гигиены полости рта	ать 0,15 процента.	е м взрослых. Для средств гигиены полости рта жидких, если они не замаркированы как противопоказанные для детей (например, "только для взрослых") обязательна маркировка о возрастном ограничении, установленным изготовителем. В случае потребления фтора из других источников обратитесь за консультацией по применению продукции к
--	----	--	------------------------------	---------------------------	--

						стомато логу или врачу.	
				(b) В кон-цен тра-ции более 0,15 – 0,5 (в вклю-чи тельно) процент а в пересчет е на молярну ю массу фтора. В смеси с другими фторсод ержащи м и соедине ни-ями, разре-ш енными в данном приложе нии, общая кон-цен трация фтора не должна превыш ать 0,5 процент а.		(b) Содерж ит 3-(N-гекса децил-N - 2) гид-рокс изтилам моний) пропилб ис(2- гидрокс изтил) аммония дифтори д. Н е предназ начена для дли-тель ного примене ния. При использ овании данного продукт а не рекомен дуется потребл ение фтора из других источни ков Н е применя ть для лиц моложе 16 лет. Примен яется по рекомен дации стомато лога и под его	

						наблюде нием.	
						(а) Содерж ит N,N, N'-трис- (полиокс изтилен) - N-гекса де-цилп ропилен диамин дигидро -фторид. Д л я любой зубной пасты с соедине ниями, содержа щими фторид в концент рации от 0,1 до 0,15 (включит ельно) процент а в пересчет е н а молярну ю массу фтора, если она н е замарки рована к а к противо по-казан ная для детей (наприме р , "	

N,N,'N'-
трис-(
полиокс
и-этилен
) -
N-гекса
децил-п
ропилен
диамин
дигид-р
офторид
(N,N',N'
-Tris(
polyoxye
thylene)-
N-hexad
ecyl-pro
pylenedi
amine
dihydrofl
uoride)

Средств
а
гигиены
полости
рта

(а) 0,15
процент
а
в
пересчет
е на
моляр-н
ую
массу
фтора.
В смеси
с
другими
фторсод
ержащи
ми
соедине
ни-ями,
разре-ш
енными
в
данном
приложе
нии,
общая
концент
ра-ция
фтора не
должна
превыш
ать 0,15
про-цен
та.

(а) не
исполь-з
овать в
сред-ств
ах
гигиены
полости
рта
жидких
для
детей в
воз-раст
е до 6
лет

х ")
обязател
ь на
следую
щая
маркиро
вка или
аналогичная по
смыслу:
Дети 6
лет и
младше:
количес
тво
использ
уемой
пасты не
должно
превыш
ать
размер
горошин
ы. Для
миними
зации
глотани
я
осущест
влять
чистку
под
контрол
ем
взрослы
х.
Для
средств
гигиены
полости
рта
жидких,
если они
не
замар-ки
рованы
как
противо
пока-зан
ные для
детей (наприме
р, "только

						для взрослы х ") обя-зате льна маркиро вка о возрас-т н о м огранич ении, установ- ленным изготов ителем. В случае потребл ения фтора из других источни к о в обратит есь за консуль тацией п о примене нию продукц ии к стомато логу или врачу.	
				(b) В кон-цен трации более 0,15 – 0,5 (вклю-чи тельно) процент а в пересчет е на моляр-н		(b) Содерж и т дигидро фторид N,N',N'- трис(полиокс изтилен) - N-гекса децилпр опилен- диамин. Н е предназ начена для дли-тель ного	

					у ю массу фтора. В смеси с другими фторсод ержащи м и соедине ни-ями, разре-ш енными в данном приложе нии, общая кон-цен трация фтора не должна пре-выш ать 0,5 процент а.	примене ния. При использ овании данного продукт а не рекомен дуется потребл ение фтора из других источни ков Не применя ть для лиц моложе 16 лет. Примен яется по рекомен дации стомато лога и под его наблюде нием.	
						(а) Содерж и т окта-дец ениламм оний фторид. Для любой зубной пасты с соедине ниями, содержа щими фторид в концент рации от 0,1 до 0,15 (	

				(а) 0,15 процент а в пересчет е на моляр-н ую массу фтора. В смеси с другими фторсод ер-жащи м и соедине ни-ями, разре-ш енными в данном приложе -нии, общая концент ра-ция	(а) не использ овать в средства х гигиены полости рта жидких для детей в возрасте до 6 лет	включит ельно) процент а в пересчет е на молярную массу фтора, если она не замарки рована как противо по-казан ная для детей (наприме р, " " только для взрослы х ")) обяза-те льна следую щая маркиро вка или аналогич ная по смыслу: Дети 6 лет и младше: количес тво использ уемой пасты не должно превыш ать размер горошин ы. Для миними зации глотани я осущест влять чистку
--	--	--	--	---	---	---

					фтора не должна превышать 0,15 процента.	под контролем взрослых. Для средств гигиены полости рта жидких, если они не замаркированы как противопоказанные для детей (например, "только для взрослых") обязательно на маркировке возрастными ограничениями, установленным изготовителем. В случае потребления фтора из других источников обратитесь за консультацией по применению продукции к
39	9 - октадец ен-1 - амин гидрофт орид (9 - Octadec n-1 - amine hydroflu oride)	Октадец енилам м о-ний фторид (Octadec nyl-amm onium fluoride) CAS № 36505- 83-6	Средств а гигиены полости рта			

						стомато логу или врачу.	
					(b) В кон-цен трации более 0,15 – 0,5 (в кклю-чи тельно) процент а в пересчет е на моляр-н ую массу фтора. В смеси с другими фторсод ержащи м и соедине ни-ями, разре-ш енными в данном приложе -нии, общая концент ра-ция фтора не должна превыш ать 0,5 про-цен та.	(b) Содерж и т октадец ениламм оний фторид. Не предназ начена для дли-тель ного примене ния. При использ овании данного продукт а не рекомен дуется потребл ение фтора из других источни ков Не применя ть для лиц моложе 16 лет. Примен яется по рекомен дации стомато лога и под его наблюде нием.	
						(a) Содерж и т фторсил икат натрия.	

						Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 (включительно) процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрослых") обязательно следующая маркировка или аналогичная по смыслу: Дети 6 лет и младше: количество использ
					(a) 0,15	
					процент	
					а	
					в	
					пересчет	
					е на	
					моляр-н	
					ую	
					массу	
					фтора.	
					В смеси	

					с другими фторсодержащими и соединени-ями, разре-шенными в данном приложе-нии, общая кон-цен-трация фтора не должна превыш-ать 0,15 про-цен-та.	(а) не исполь-зовать в средствах гигиены полости рта жидких для детей в возрасте до 6 лет	уемой пасты не должно превыш-а-ть размер горошин-ы. Для миними-зации глотани-я осущест-влять чистку под контрол-е м-взрослы-х. Для средств гигиены полости рта жидких, если они не замар-ки-рованы как противо-пока-зан-ные для детей (наприме-р, "только для взрослы-х") обяза-те-льна маркиро-вка о-возрастн-о м-огранич-ении, установ-ленным изгото-вителем.
40	Динатри-й гексафт-орсиликат (Disodium hexafluoro-silicate)	Фторсил-икат натрия (Sodium fluorosili-cate) CAS № 16893-85-9, EC № 240-934-8	Средств-а гигиены полости рта				

						В случае потребления фтора из других источников обратитесь за консультацией по применению продукции к стоматологу или врачу.	
				(b) В концентрации более 0,15 – 0,5 (включительно) процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация		(b) Содержит фторсилкат натрия. Не предназначена для длительного применения. При использовании данного продукта не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет.	

					ра-ция фтора не должна превыш ать 0,5 процент а.	Примен яется по рекомен дации стомато лога и под его наблюде нием.	
						(а) Содерж и т фторсил икат калия Д л я любой зубной пасты с соедине ниями, содержа щими фторид в концент рации от 0,1 до 0,15 (включит ельно) процент а в пересчет е н а молярну ю массу фтора, если она н е замарки рована к а к противо по-казан ная для детей (наприме р , " только д л я взрослы х ")	

41	Дикалия гексафт орсиликат (Dipotassi um hexaflu rosilicate)	Фторсил икат калия (Potassiu m fluorosili cate) CAS № 16871- 90-2, ЕС № 240-896- 2	Средств а гигиены полости рта	(а) 0,15 процент а в пересчет е на моляр-н ую массу фтора. В смеси с другими фторсод ер-жащи ми соедине ни-ями, разре-ш енными в данном приложе -нии, общая концент ра-ция фтора не должна превыш ать 0,15 про-цен та.	(а) не использ овать в средства х гигиены полости рта жидких для детей в возрасте до 6 лет	обязате льна следую щая маркиро вка или аналогич ная по смыслу: Дети 6 лет и младше: количес тво использ уемой пасты не должно превыш ать размер горошин ы. Для миними зации глотани я осущест влять чистку под контрол ем взрослы х. Для средств гигиены полости рта жидких, если они не замар-ки рованы как противо пока-зан ные для детей (наприме р, "только для
----	---	--	---	--	--	---

						взрослы х ") обяза-те льна маркиро вка о возрастн о м огранич ении, установ ленным изготов ителем. В случае потребл ения фтора из других источни к о в обратит есь за консуль тацией п о примене нию продукц ии к стомато логу или врачу.	
				(b) В кон-цен трации более 0,15 – 0,5 (включи тельно) процент а в пересчет е на моляру ю массу фтора. В смеси с другими		(b) Содерж и т фторсил икат калия. Н е предназ начена для дли-тель ного примене ния. При использ овании данного продукт а не рекомен	

					фторсодержащими и соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.	дугается потребление фтора из других источников Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.	
						(а) Содержит фторсил и кат аммония . Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 (включит ельно) процент а в пересчет е на молярну ю массу фтора, если она	

				(а) 0,15 процент а в пересчет е на моляр-н у ю массу фтора. В смеси с другими фторсод ер-жаци м и соедине ни-ями, разре-ш енными в данном приложе -нии, общая концент ра-ция фтора не должна превыш ать 0,15 про-цен та.	не замарки рована как противо по-казан ная для детей (наприме р, " только для взрослы х ") обяза тел ь на следу ю щ а я маркиро вка или аналоги чная по смыслу: Дети 6 лет и младше: количес тво исполь з уемой пасты не должно превыш ать размер горошин ы. Для миними зации глотани я осущест влять чистку под контрол ем взрослы х. Для средств гигиены полости рта
--	--	--	--	--	--

	42	а т аммония (Ammoni u m hexaflu rosilicate)	u m fluorosili cate) CAS № 16919- 19-0, EC № 240-968- 3	Средств а гигиены полости рта			жидких, если они н е замар-ки рованы к а к противо пока-зан ные для детей (наприме р , " только для взрослы х ") обяза-те льна маркиро вка о возрастн о м огранич ении, установ ленным изготов ителем. В случае потребл ения фтора из других источни к о в обратит есь за консуль тацией п о примене нию продукц ии к стомато логу или врачу.	
					(b) В кон-цен трации более 0,15 –		(b) Содерж и т фторсил икат аммония .	

					0,5 (включительно) процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими и соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.	Не предназначена для длительного применения. При использовании данного продукта не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.	
						(а) Содержит фторсиликат магния. Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид	

[illegible]

	43	Гексафторсил орсил а т магния (Magnesium hexafluoro silicate)	Фторсил икат магния (Magnesium hexafluoro silicate) CAS No 16949- 65-8, ЕС № 241-022- 2	Средств а гигиены полости рта	в данном приложе -нии, общая концент ра-ция фтора не должна превыш ать 0,15 про-цен та.	детей в возрасте до 6 лет	зирования глотани я осущест влять чистку п о д контрол е м взрослы х. Для средств гигиены полости р т а жидких, если они н е замар-ки рованы к а к противо пока-зан ные для детей (наприме р , " только для взрослы х ") обязате льна маркиро вка о возрас-т н о м огранич ении, установ ленным изготов ителем. В случае потребл ения фтора из других источни к о в обратит есь за консуль
--	----	---	--	---	---	------------------------------------	---

						тацией п о примене нию продукц ии к стомато логу или врачу.	
					(b) В концент рации более 0,15 – 0,5 (в ключит ельно) процент а в пересчет е на молярну ю массу фтора. В смеси с другими фторсод ержащи м и соедине ниями, разреше нными в данном приложе нии, общая концент ра-ция фтора не должна превыш ать 0,5 процент а.	(b) Содерж и т фторсил икат магния. Н е предназ начена для дли-тель ного примене ния. При использ овании данного продукт а не рекомен дуется потребл ение фтора из других источни ков Н е применя ть для лиц моложе 16 лет. Примен яется по рекомен дации стомато лога и под его наблюде нием.	

				(а) 0,15 процент а	(а) Содерж и т гидрофт орид никомет анола Д л я любой зубной пасты с соедине ниями, содержа щими фторид в концент рации от 0,1 до 0,15 (в включит ельно) процент а в пересчет е н а молярну ю массу фтора, если она н е замарки рована к а к противо показан ная для детей (наприме р , " только д л я взрослы х ") обязател ь н а следую щ а я маркиро вка или
--	--	--	--	--------------------------	---

				в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими и соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.		аналогичная по смыслу: Дети 6 лет и младше: количество использованной пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизации глотания осуществлять чистку под контролем взрослых. Для средств гигиены полости рта жидких, если они не замаркированы как противопоказанные для детей (например, "только для взрослых") обязательно на маркировка о
47	3 - пиридин метанол гидрофторид (3 - Pyridine methanol hydrofluoride)	Гидрофторид никометанола (Nicomethanol hydrofluoride) CAS No 62756-44-9	Средства гигиены полости рта		(а) не использовать в средствах гигиены полости рта жидких для детей в возрасте до 6 лет	

						возраст о м огранич ении, установ ленным изготов ителем. В случае потребл ения фтора из других источни к о в обратит есь за консуль тацией п о примене нию продукц ии к стомато логу или врачу.
				(b) В кон-цен трации более 0,15 – 0,5 (в ключе-чи тельно) процент а в пересчет е на моляр-н ую массу фтора. В смеси с другими фторсод ержащи ми соедине		(b) Содерж и т гидрофт орид никOMET анола. Н е предназ начена для дли-тель ного примене ния. При использ овании данного продукт а не рекомен дуется потребл ение фтора из других

					ни-ями, разре-ш енными в данном приложе -нии, общая концент ра-ция фтора не должна превыш ать 0,5 процент а	источни ков Н е применя ть для лиц моложе 16 лет. Примен яется по рекомен дации стомато лога и под его наблюде нием.	
						(а) Содерж и т фторист ы й магний. Д л я любой зубной пасты с соедине ниями, содержа щими фторид в концент рации от 0,1 до 0,15 (включит ельно) процент а в пересчет е н а молярну ю массу фтора, если она н е замарки рована к а к противо -	

56	Фтористый магний (Magnesium Fluoride)	Фтористый магний (Magnesium Fluoride)	Средства гигиены полости рта	(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента. (а) не использовать в средствах гигиены полости рта жидких для детей в возрасте до 6 лет	показанная для детей (например, "только для взрослых") обязательная маркировка или аналогичная по смыслу: Дети 6 лет и младше: количество в упаковке должно превышать размер горошины. Для минимизации глотания осуществлять чистку под контролем взрослых. Для средств гигиены полости рта жидких, если они не замаркированы
----	--	--	------------------------------	---	--

		u m fluoride)	CAS No 7783-40-6, EC № 231-995-1		к а к противо пока-зан ные для детей (наприме р , " только д л я взрослы х ") обяза-те льна маркиро вка о возрастн о м огранич ении, установ ленным изготов ителем. В случае потребл ения фтора из других источни к о в обратит есь за консуль тацией п о примене нию продукц ии к стомато логу или врачу.	
				(b) В кон-цен трации более 0,15 – 0,5 (включи- тельно) процент а	(b) Содерж и т фторист ы й магний. Н е предназ начена д л я дли-тель ного	

				в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими и соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.	применения. При использовании данного продукта не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.	
			(а) Смываемая продукция для волос	а) 3 процента	(a), (b), (c) Не использовать в продукции для детей в возрасте до 3 лет. Не использовать: - в формах, которые	

98	2 - гидроксибензойная кислота (Benzoic acid, 2-hydroxy-) ⁽⁹⁾	Салициловая кислота (Salicylic acid) CAS № 69-72-7, ЕС № 200-712-3	(b) Другая продукция, кроме лосьона для тела, теней для век, туши, подводки для глаз, губной помады, шарикового дезодоранта	b) 2 могут привести к воздействию на легкие конечного потребителя при вдыхании; - в средствах гигиены полости рта. При использовании для других целей, а не для подавления и размножения микроорганизмов, назначение ингредиента должно быть указано в технических документах. Общая концентрация салициловой кислоты в независимости от целей	(a), (b), (c) Не предназначена для использования детьми в возрасте до 3 лет (10)
----	---	--	---	--	--

					про-цен та	использ ования		
				(с) Лосьон для тела , тени для век, тушь, подводк а для глаз, губная помада, шариков ый дезодор ант	с) 0,5 про-цен та	н е должна превыш а т ь установ лен-ных значени й.		
			Масло шишки пихты белой (Abies Alba Cone Oil); экстракт шишки пихты белой (Abies Alba Cone Extract); масло хвои пихты белой (Abies Alba Leaf Oil)			Перекис н о е число менее 1 0 ммоЛЬ/л ⁽ 15)		
	103	Масло и экстракт пихты белой (Abies alba oil and extract)	воск хвои пихты белой (Abies Alba Leaf Cera); экстракт хвои пихты белой					

			(Abies Alba Needle Extract); масло хвои пихты белой (Abies Alba Needle Oil) CAS № 90028- 76-5 ЕС № 289-870- 2				
					Должно быть напечат ано на этикетке : Соотно шение краски и окислит еля в смеси. При окрашив ании волос могут возника ть серьезн ые аллерги ческие реакции. Прочита йте инструк ции и следуют е им. Данная продукц ия не предназ начена		

199	1,3-Бензолдиол, 4-хлор- (1,3-Benzene diol, 4-chloro-)	4 - хлоррезорцинол (4 - Chlororesorcinol) CAS № 95-88-5 EC № 202-462-0	Красящие вещества в окислительных красках для волос	После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация применяемая для окрашивания волос не должна превышать 2,5 процента	для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и (или) повреждение кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее были	";
-----	---	--	---	--	--	----

						испытал и реакцию на временн ые татуиро вки "	
						черной хной".	

б) дополнить позициями 323 – 326 следующего содержания:

						Для (а): Н е использ овать в солнцез ащитно й продук ции и продук ции, предназ наченн ой для использ ования в условия х длитель ного воздейс твия естеств енного или искусст венного УФ-изл учения.	
				(а) Несмы- ваемая продук ция	(а) 0,1 процен та		
"	323	Метил- N-мети лантран илат (Methyl- N-meth ylanthra nilate)	(CAS № 85-91-6, EN № 201-642-6)			Для (а) и (б): - Н е использ овать с нитроз ирующ ими агентам и	

				(б) Смы-ва емая продук ция	(б) 0,2 процен та	- Максим альное содерж ание нитроза минов: 50 мкг/ кг Хранит ь в контей нерах, н е содерж ащих нитрит ы		
				(а) Несмы-ваемая продукция для кожи (кроме продукции макияжа для лица, лосьонов для тела в форме спрея/аэ-розоля, дезодоран-тов в фор-ме спрея/ аэ-розоля, парфю-мерной продукции на водно-спиртово й основе) и несмыва-емая продукция для волос (за исклю-чением продукции в форме спреев/ аэ-розолей)	(а) 0,06 процен та			
				(b) Продукция для маки-яжа лица (кроме продукции для маки-яжа губ, глаз и средств для снятия макияжа)	(b) 0,05 процен та			
				(с) Продук-ция для макияжа	(с) 0,002			

				глаз и средства для снятия макияжа	процент			
				(d) Несмываемая продукция для волос (в форме спрея/аэро-золя)	(d) 0,009 процент	Н е использовать в препаратах для детей младше 6 лет, за исключением (k) "Зубная паста"		
				(e) Дезо-доранты в форме спрея/аэро-золя	(e) 0,003 процент			
				(f) Лосьоны для тела в форме спрея/аэро-золя	(f) 0,04 процент			
				(g) Смываемая продукция для кожи (кроме средств для мытья рук) и смываемая продукция для волос	(g) 0,06 процент			
				(h) Продукция для мытья рук	(h) 0,6 процент			
				(i) Парфюмерная продукция на водно-спиртовой основе	(i) 0,6 процент			
				(j) Продукция для губ	(j) 0,03 процент			
				(k) Зубная паста	(k) 2,52 процент			
				(l) Жидкость для полоскания рта предназначенная для детей в возрасте 6 – 10 лет.	(l) 0,1 процент			
				(m) Жидкость для полоскания рта				
324	Метил 2 - гидроксibenzoat (Methyl 2 - hydroxy - benzoate)	Метил салицилат (Methyl Salicylate) (CAS 119-36-8, EN 204-317-7)						

				пред-назначена для детей старше 10 лет и взрослых.	(m) 0,6 процента			
				(n) Спрей для полости рта	(n) 0,65 процента			
	325	2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol)	Бутилированный гидрокси-толуол (Butylated Hydroxytoluene) (CAS 128-37-0, EN 204-881-4)	a) Жидкость для полоскания рта b) Зубная паста c) Другая продукция смываемая и несмываемая	a) 0,001 процента b) 0,1 процента c) 0,8 процента			
326	1Н-инден-1,3(2Н)-дион, 2-(2-хинолин)-, сульфированный, натриевые соли (1Н-Indene-1,3(2Н)-dione, 2-(2-quinolinyl)-, sulfonated, sodium salts) (C I 47005) 23	Кислотный желтый 3 (Acid Yellow 3) (CAS 804-92-0, EN 305-897-5)	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	0,5 процента			"",	

в) дополнить сноской 23 следующего содержания:

"²³Как краситель, см. ссылочный номер 82 приложения 3 к техническому регламенту."

3. В приложении 3 к указанному техническому регламенту:

а) позицию 143 изложить в следующей редакции:

"	143	Диокси д титана Titanium dioxide (1)	77891		236-675 -5	белый			- E171 - Диокси д титана в виде порошк а , содерж а-щего 1% или более частиц с аэроди на-миче ским диамет ром ≤ 10 мкм, использ у-ется в соответ ст-вии с пунк-то м 321 прило жения 2		",";
---	-----	---	-------	--	---------------	-------	--	--	---	--	------

б) в примечании 2 в предложении втором слово "окраски" заменить словом "окрашивания".

4. В приложении 4 к указанному техническому регламенту:

а) позицию 51 изложить в следующей редакции:

									Н е использ овать, если не будет доказан о, что максима льная теорети ческая концент		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

"	51	Натрий N - (гид-рокс иметил) глицина т (Sodium N - (hydroxy methyl) glycinate)	гидрокс име-тил глицина т натрия Sodium Hydroxy me-thylg lycinate	70161- 44-3	274-357- 8	0,5 процент а	рация высвобо ждаемого формаль дегида составля ет не более 0,1 про-цен та, в случае если в продукц и и присутс твуют и другие ингреди енты, выделя ющие формаль дегид (пункты 20, 21, 27, 30, 33, 45, 46, 49, 51 и 55 настоящ его приложе ния)	".
---	----	---	--	----------------	---------------	---------------------	--	----

б) в позиции 55 в графе 3 слово "бензилхемиформаль" заменить словом "бензилгемиформаль";

в) в сноске 16 цифры "288" заменить цифрами "286";

г) примечание 2 изложить в следующей редакции:

"2. Вся готовая парфюмерно-косметическая продукция, содержащая вещества, перечисленные в настоящем приложении, выделяющие формальдегид, должна иметь маркировку с предупреждением "выделяет формальдегид", если максимальная теоретическая концентрация формальдегида, выделяемого из готовой продукции, превышает 0,05 %, независимо от того, содержит ли готовая продукция одно или несколько веществ, выделяющих формальдегид.";

д) в примечании 2 слова "превышает 0,05 %" заменить словами "превышает 0,001 % (10 ppm)".

5. В приложении 5 к указанному техническому регламенту:

а) позиции 3, 4 и 10 изложить в следующей редакции:

"	3	Бензойная кислота, 2-гидрокси-3,3,5-триметил-циклогексилэфир/ Гомосалат (Benzoic acid, 2-hydroxy-, 3,3,5-trimethyl cyclohexyl ester/ Homosalate)	гомосалат (Homosalate)	118-56-9	204-260-8	Продукция для лица, за исключением пропеллентных спреев	7,34 процента			
						а) Продукция для лица, для рук и для губ, за исключением продукции с пропеллентом и продукции в виде спрея с помпой	а) 6 процентов	Для а) и б) не более 0,5 процента для защиты состава продукции и а) При использовании в концентрации 0,5 процента для защиты состава		
	4	2-гидрокси-4-метоксибензофенон/ Оксibenзон	бензофенон-3	131-57-7		б) Продукция для тела, в том числе с пропеллентом и продукцией в		продукции и количество, используемое в качестве УФ-фильтра, не должно	Для а) и б): Содерж	

		(2 - hydroxy-4 - methoxy benzo-phenone/ Oxybenzone)	(Benzophenone-3)		205-031-5	виде спрея с помпой	б) 2,2 процента	превышать 5,5 процента.	и т бензофенон-3 ⁽¹⁾	
						с) Другая продукция	с) 0,5 процента	б) При использовании в концентрации 0,5 процента для защиты состава продукции и количества, используемое в качестве УФ-фильтра, не должно превышать 1,7 процента.		
10		2-Циано-3,3-дифенил-акриловой кислоты, 2 - этилгексилэфир/ Октокрилен (2-Суано-3,3-diphenyl acrylic acid, 2-ethylhexyl ester / Octocrylene) ⁶	октокрилен Octocrylene	6197-30-4	228-250-8	а) продукция в виде спрея с пропеллентом	а) 9 процентов			";
						б) Другая продукция	б) 10 процентов			

б) дополнить позициями 33 и 34 следующего содержания:

"	33	1,1'-(1,4-пипераз индиил) бис [1-[2-[4-(диэтила мино)-2-гидрокс ибензоил л]фенил] метанон (1,1'-(1,4 - piperazin ediy) bis [1-[2-[4-(diethyla mino)- 2 - hydroxy benzoyl] phenyl]-methano ne)	Бис-(ди-этила мино-гидрокси-бензоил бензоил) пи-пераз ин (Bis- (Diethyla minohydroxy-benzoyl Benzoyl) Piperazine)	919803-06-8	485-100-6		1 0 про-цен тов ⁷		
	34	1,1'-(1,4-пипераз индиил) бис [1-[2-[4-(диэтила мино)-2-гидрокс ибензоил л]фенил] метанон (1,1'-(1,4 -	Бис-(ди-этила мино-гидрокси-бензоил бензоил) пи-пераз ин (нано)	919803-06-8	485-100-6		1 0 про-цен тов ⁷	Допуска ются только нано-ма териалы, имеющие следующие характеристики: - Чистота ≥ 97% - Средний размер частиц D50 (50 % количества частиц меньше этого	

		piperazin ediy) bis [1-[2-[4- (diethyla mino)- 2 - hydroxy benzoyl] phenyl]- methano ne)	(Bis- (Diethyla minohyd roxy- benzoyl Benzoyl) Piperazin e (nano))					диаметр а): Н е менее 50 нм. Н е использ о-вать в формах, которые могут привест и к воздейст вию на легкие конечно г о потреби теля при вдыхани и.		";
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	----

в) дополнить сносками 6 и 7 следующего содержания:

"⁶ Бензофенон как примесь и/или продукт разложения октокрилена должен содержаться не более чем в следовых количествах.

⁷ При совместном применении Бис-(Диэтиламиногидроксibenзоил)пиперазина и Бис-Диэтиламиногидроксibenзоил-бензоил)пиперазина (нано) сумма не должна превышать 10 процентов."