

Об утверждении состава аптечки первой помощи (автотранспортной)

Утративший силу

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам здравоохранения от 18 апреля 2000 года N 225. Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Казахстан 24 мая 2000 года N 1138. Утратил силу - приказом Министра здравоохранения РК от 20 декабря 2004 года N 876 (V043358)

В целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 1997 года N 1650 Р971650_ "Об утверждении Правил дорожного движения Республики Казахстан", снижения числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях, своевременного оказания само- и взаимопомощи участниками дорожно-транспортного происшествия, приказываю.

- 1. Утвердить прилагаемые:
- 1) Состав аптечки первой помощи (автотранспортной);
- 2) Инструкцию по применению лекарственных средств аптечки первой помощи (автотранспортной) и оказанию само- и взаимопомощи участниками дорожно-транспортного происшествия.
- 2. Считать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения, образования и спорта Республики Казахстан от 02 апреля 1999 года N 172 V990739_ "Об утверждении состава аптечки первой помощи (транспортной)".
- 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Председателя Ибраева С.Е.

Председатель

Утвержден приказом Агентства Республики Казахстан по делам здравоохранения от 18 апреля 2000 года N 225

С о с т а в аптечки первой помощи (автотранспортной)

N | Наименование | количество |

	Обезболивающие, противовоспалительные и противошоко	вые
	лекарственные средства, применяемые при травмах (уши	ибы,
	переломы, вывихи, ожоги), ранениях, шоке	
1)	анальгин 0,5 N 10	уп.
2)	ацетилсалициловая кислота (аспирин) 0,5 N 10	1 уп.
3)	сульфацила натрия раствор 30 % - 5,0 (глазные капли)	фл.
	Средства для остановки кровотечения, обработки	И
	перевязки ран	
4)	жгут кровоостанавливающий типа Эсмарха	l шт.
5)	бинт стерильный 10Х5	шт.
6)	бинт не стерильный 10Х5	шт.
7)	бинт не стерильный 5Х5	шт.
8)	повязка стерильная ватно-марлевая 65Х43	шт.
9) .	лейкопластырь бактерицидный 2,5X7,2 или 6X10	4 шт.
10)	салфетки марлевые стерильные	2 уп.
11)	раствор йода спиртовый 5% или раствор бриллиантовой	1 фл.
	зелени 1 %	
12) :	лейкопластырь медицинский 1X500 или 2X500 или 1X250	1 шт.
13)	бинт эластичный трубчатый медицинский N 1,3,6 по	1 шт.
14)	вата гигроскопическая нестерильная 50 гр.	шт.
15) п	пероксид водорода раствор 3% (или гидроперит - 1 уп.) 1 фл.	
	Средства при болях в серди	(e
16)	нитроглицерин табл. N 40 или капс. N 20 (тринитролонг)	1 уп.
17) в	валидол таблетки или капсулы 1 уп.	
	Средства при обмороке (коллапс	e)
-	аммиака раствор 10% (нашатырный спирт) - во флаконах и ампулах	1 уп.
	Средства при отравлениях пище	й
19)	уголь активированный N 10	2 уп.
	Средства при стрессовых реакция	ΙX
20)	корвалол 1 ф	

Примечание:

лекарственные средства хранятся в футляре. К аптечке первой помощи (автотранспортной) прилагаются стаканчик для приема лекарств и Инструкция по применению лекарственных средств и оказанию само- и взаимопомощи.

Не допускается произвольная замена указанных в перечне лекарственных средств и изделий медицинского назначения и применение лекарственных средств с поврежденной маркировкой и истекшим сроком годности.

Аптечка первой помощи (автотранспортная) подлежит своевременному пополнению.

Утверждена приказом Агентства Республики Казахстан по делам здравоохранения от 18 апреля 2000 года N 225

Инструкция

по применению лекарственных средств аптечки первой помощи (автотранспортной) и оказанию само- и взаимопомощи участниками дорожно-транспортного происшествия

1. Травма: ушибы, переломы, вывихи

При травмах дают обезболивающее средство (анальгин), иммобилизируют конечность (шинами, подручными средствами, или фиксируют руку к туловищу, ногу к ноге), накладывают холод на место травмы.

2. Раны и кровотечения

При артериальном кровотечении (кровь алая, вытекает пульсирующей струей) - наложить жгут выше раны, оставить записку с указанием времени наложения жгута, наложить на рану повязку. Конечность иммобилизировать, больному дать обезболивающее средство (анальгин).

При венозном кровотечении (кровь темная не пульсирует) - наложить на рану салфетку стерильную и сделать давящую повязку бинтом.

При капилярном кровотечении - на рану наложить стерильную повязку, дать обезболивающее средство (анальгин). Мелкие раны и ссадины обработать раствором бриллиантовой зелени, йода или перекиси водорода, заклеить бактерицидным пластырем.

3. Ожоги

При обширных ожогах наложить стерильную повязку, дать обезболивающее средство (анальгин). Выпить стакан щелочной воды.

4. Боли в сердце

При болях в сердце положить нитроглицерин или валидол одну таблетку под язык или выпить 15-20 капель корвалола в 50 мл воды.

5. Обморок

При обмороке положить больного на пол, ноги приподнять, дать понюхать

нашатырный спирт на ватке.

6. Стрессовые реакции

При стрессовой реакции развести 30 капель корвалола в 50 мл воды и дать в ы п и т ь б о л ь н о м у .

7. Сердечно-легочная реанимация

Сердечно-легочная реанимация проводится при отсутствии у больного сознания, дыхания и пульса на сонной артерии путем непрямого массажа сердца и искусственного дыхания "рот в рот" до прибытия медработника или восстановления дыхания и пульса.

8. Отравления

При отравлении промыть желудок. Дать принять 2-3 таблетки активированного угля.

9. Поражение глаз

При попадании в глаза инородных тел и веществ или травме глаз необходимо глаза промыть водой, закапать 2-3 капли сульфацила натрия.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан